

Gravité **GRAVE**

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Rate non fonctionnelle (drépanocytose, splénectomie).



Symptômes

Susceptibilité infections encapsulés (pneumocoque

méningo

Hib)



Causes

Splénectomie

drépanocytose

maladie coeliaque



Complications

Sepsis fulminant à germes encapsulés (OPSI)



Traitement

Vaccination

antibioprophylaxie

éducation



Diagnostic différentiel

Déficit immunitaire

neutropénie

VIH



Examens paracliniques

Frottis sanguin (corps de Howell-Jolly)

NFS



Protocole médicamenteux

Vaccination: Pneumovax 23 + Prevenar 13 + Méningo ACWY + Hib + Grippe; Pénicilline V 1MUl x2/j PO prophylaxie; Consultation urgente si fièvre >38.5°C



Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Plaq<150000=thrombopénie

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.