

Gravité **MOYENNE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Incompétence cervicale causant fausses couches tardives.



Symptômes

Fausses couches tardives récurrentes T2

accouchement prématuré



Causes

Anomalie cervicale congénitale

post-conisation

traumatisme



Complications

Prématurité

fausse couche

chorioamniotite



Traitement

Cerclage cervical

progestérone



Diagnostic différentiel

MAP

chorioamniotite

RPM

placenta praevia



Examens paracliniques

Échographie: Raccourcissement cervical <25mm

funneling



Protocole médicamenteux

Cerclage cervical McDonald à 13-16 SA si ATCD; Progestérone vaginale 200mg/j si col court; Repos relatif; Cerclage d'urgence si dilatation sur col court



Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.