

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Malformation cardiaque avec shunt droit-gauche.

Symptômes

Cyanose néonatale

dyspnée

polyglobulie

hippocratisme digital

Causes

Tétralogie de Fallot

TGV

atrésie tricuspide

Complications

Malaises anoxiques

abcès cérébral

endocardite

Traitement

Chirurgie correctrice

prostaglandine E1 si ductodépendant

Diagnostic différentiel

Détresse respiratoire néonatale

sepsis

cardiopathie non cyanogène

Examens paracliniques

Échographie cardiaque

SpO2 pré/post-ductale

gazométrie

scanner cardiaque

Protocole médicamenteux

Prostaglandine E1 (Alprostadil) 0.05-0.1µg/kg/min IVSE si ductodépendant; Chirurgie correctrice programmée; Malaise Fallot: Genoux-poitrine + Morphine + O2 + Phényléphrine

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.