

Gravité **GRAVE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Inflammation chronique voies biliaires.



Symptômes

Ictère fluctuant

prurit

fatigue

association MICI 80%



Causes

Auto-immune

association MICI



Complications

Cirrhose biliaire

cholangiocarcinome (10-15%)



Traitement

Acide ursodésoxycholique

transplantation



Diagnostic différentiel

CBP

cholangiocarcinome

cholangite IgG4

obstruction biliaire



Examens paracliniques

Cholangio-IRM (sténoses+dilatations chapelet)

bilan hépatique cholestase

pANCA

coloscopie



Protocole médicamenteux

UDCA 15-20mg/kg/j (controversé); Dilatation endoscopique sténoses dominantes; Transplantation hépatique si cirrhose; Surveillance cholangiocarcinome: IRM+CA19-9/an



Interprétation des examens

IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.