

Gravité **MOYENNE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

PA>180/110 sans atteinte organe.

## Symptômes

Céphalées vertiges acouphènes épistaxis

## Causes

HTA non traitée oubli traitement stress

## Complications

Conversion en urgence hypertensive si non traitée

## Traitement

Reprendre/adapter traitement PO repos

## Diagnostic différentiel

Urgence hypertensive AVC anxiété phéochromocytome

## Examens paracliniques

PA aux 2 bras BU ECG créatinine

## Protocole médicamenteux

Repos 30min puis reconstrôler PA; Reprendre traitement PO habituel; Nifédipine 10mg PO si persistant; Consultation sous 48h; PAS de traitement IV

## Interprétation des examens

Créatinine élevée=IR Calculer DFG ECG: Rythme ST ondes Q conduction

## ☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.