

## Gravité MOYENNE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

### Définition

Anomalie développementale hanche du nourrisson.

### Symptômes

Asymétrie plis limitation abduction ressaut

Barlow/Ortolani+

### Causes

Facteurs mécaniques intra-utérins siège

ATCD familial

### Complications

Luxation complète arthrose précoce boiterie

### Traitement

Langes en abduction harnais de Pavlik

chirurgie si tardif

### Diagnostic différentiel

Fracture infection hanche tumeur inégalité membres

### Examens paracliniques

Échographie hanches (avant 4 mois) radio bassin (après 4 mois)

### Protocole médicamenteux

<6 mois: Harnais de Pavlik 23h/24 6-12 semaines; 6-18 mois: Réduction sous AG + plâtre; >18 mois: Chirurgie (ostéotomie); Surveillance radio jusqu'à maturité osseuse

## ☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avvertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.