

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Voir Embolie amniotique.



Symptômes

Détresse respiratoire brutale per-partum

collapsus

CIVD



Causes

Passage liquide amniotique circulation maternelle



Complications

CIVD

arrêt cardiaque

décès maternel 60-80%



Traitement

Réanimation

traitement CIVD



Diagnostic différentiel

Embolie pulmonaire

éclampsie

HPP

choc septique



Examens paracliniques

Diagnostic clinique d'exclusion

NFS

bilan coagulation



Protocole médicamenteux

RCP immédiate; O2 100%; Remplissage+vasopresseurs; Transfusion massive; Césarienne péri-mortem si <5min



Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Pla<150000=thrombopénie

☑ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.