

Gravité **MOYENNE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

## ● Définition

Tumeur vasculaire bénigne adolescent masculin.

## ● Symptômes

Obstruction nasale épistaxis récidivantes abondantes

## ● Causes

Angiofibrome adolescent masculin

hormono-dépendant

## ● Complications

Hémorragie massive extension intracrânienne

## ● Traitement

Embolisation + chirurgie exérèse

## ● Diagnostic différentiel

Polype antrochoanal cancer cavum lymphome angiome

## ● Examens paracliniques

Scanner+IRM (tumeur très vascularisée) artériographie pré-embolisation PAS DE BIOPSIE (hémorragie)

## ● Protocole médicamenteux

Embolisation artérielle sélective J-2 puis Chirurgie endoscopique ou voie transmaxillaire; Radiothérapie si résidu inopérable; Surveillance 5 ans (récidive)

## ● Interprétation des examens

Scanner: Collections masses épanchements IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

## ☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.