

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Ischémie intestinale aiguë, urgence chirurgicale.

Symptômes

Douleur abdominale brutale intense

diarrhée sanglante

choc

Causes

FA+embolie

thrombose artère mésentérique

bas débit

Complications

Nécrose intestinale

péritonite

syndrome grêle court

décès

Traitement

Revascularisation urgente

résection intestin nécrosé

Diagnostic différentiel

Pancréatite

occlusion

perforation

anévrisme aorte rompu

Examens paracliniques

Scanner abdominal injecté (pneumatose)

absence rehaussement)

lactates très élevés

NFS

Protocole médicamenteux

Réanimation; Anticoagulation héparine; Embolectomie ou Thrombolyse in situ <6h; Résection intestin nécrosé; Second look 24-48h; Nutrition parentérale

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Plaq<150000=thrombopénie

Scanner: Collections

masses

épanchements

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.