

Gravité **MOYENNE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Déformation conique progressive cornée.

Symptômes

Baisse visuelle progressive astigmatisme irrégulier

photophobie

Causes

Frottements oculaires atopie trisomie 21

génétique

Complications

Cécité si avancé nécessité greffe

Traitement

Cross-linking lentilles rigides

greffe cornée si avancé

Diagnostic différentiel

Astigmatisme simple kératoglobe dégénérescence marginale pellucide

Examens paracliniques

Topographie cornéenne (cone) pachymétrie (amincissement) aberrométrie

Protocole médicamenteux

Arrêt frottements (essentiel); Cross-linking cornéen (CXL) si progression; Lentilles rigides; Anneaux intracornéens; Greffe lamellaire si avancé (DALK)

☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.