

Gravité **MOYENNE**

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Hyperextension congénitale du genou.

● Symptômes

Genou en recurvatum à la naissance

gêne flexion

● Causes

Malposition intra-utérine

quadriceps raccourci

arthrogrypose

● ⚠ Complications

Rigidité

retard marche

insuffisance ligamentaire

● Traitement

Manipulation douce

attelle en flexion progressive

chirurgie si échec

● Diagnostic différentiel

Fracture fémorale

genu recurvatum acquis

● Examens paracliniques

Radio genou (subluxation/luxation tibiale antérieure)

écho hanche associée

● Protocole médicamenteux

Manipulation progressive en flexion + plâtre; Attelle articulée; Chirurgie (allongement quadriceps) si irréductible; Association fréquente luxation hanche

☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.