

Gravité **GRAVE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Anomalie vasculaire avec shunt artério-veineux.



Symptômes

Céphalées

crises épileptiques

hémorragie cérébrale

déficit focal



Causes

Malformation congénitale

anomalie angiogénèse



Complications

Hémorragie cérébrale (2-4%/an)

épilepsie



Traitement

Embolisation

radiochirurgie

microchirurgie



Diagnostic différentiel

Anévrisme

tumeur

cavernome

fistule durale



Examens paracliniques

Angiographie cérébrale (gold standard)

IRM cérébrale

angioscanner



Protocole médicamenteux

Classification Spetzler-Martin; Petite accessible: Microchirurgie; Grade élevé: Embolisation + Radiochirurgie gamma knife; Antiépileptiques si épilepsie



Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.