

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

5ème maladie infantile par Parvovirus B19.

Symptômes

Éruption joues souffletées puis réticulée corps

fièvre modérée

Causes

Parvovirus B19

transmission respiratoire

Complications

Crise aplastique si drépanocytose

anasarque fœtale si grossesse

Traitement

Symptomatique

Diagnostic différentiel

Rougeole

rubéole

scarlatine

allergie

maladie de Kawasaki

Examens paracliniques

Sérologie IgM Parvovirus B19

NFS (réticulocytopenie transitoire)

Protocole médicamenteux

Symptomatique: Paracétamol; Surveillance NFS si drépanocytose; Éviction femmes enceintes non immunisées; Rechercher anasarque fœtale si contamination grossesse

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Pla<150000=thrombopénie

☐☐ Prise en charge hospitalière

Ambulatoire

contrôle 7-14j

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.