

Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Dilatation localisée aorte >50%.



Symptômes

Souvent asymptomatique

douleur dorsale

masse pulsatile



Causes

Athérosclérose

HTA

tabac

Marfan



Complications

Rupture (mortalité >80%)

dissection



Traitement

Surveillance

chirurgie si >55mm

contrôle PA



Diagnostic différentiel

Kyste rénal

lymphome

masse rétropéritonéale



Examens paracliniques

Écho abdominale (dépistage)

angioscanner

IRM

surveillance annuelle si <55mm



Protocole médicamenteux

Surveillance si <55mm: scanner annuel + contrôle PA; Chirurgie si >55mm ou croissance >5mm/an; Pontage prothétique ou endoprothèse; Bêtabloquant

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.