

Gravité **MOYENNE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Tumeur bénigne des méninges.

● Symptômes

Céphalées

crises épileptiques

déficit neurologique lentement progressif

● Causes

Irradiation

NF2

hormones (progestérone)

● Complications

Compression cérébrale

récidive post-chirurgicale

● Traitement

Chirurgie exérèse

radiothérapie si résidu/récidive

● Diagnostic différentiel

Métastase méningée

lymphome

schwannome

gliome

● Examens paracliniques

IRM cérébrale (extra-axial)

prise contraste homogène

queue durale)

scanner

● Protocole médicamenteux

Surveillance si petit asymptomatique; Chirurgie: Exérèse Simpson grade I-II; Radiothérapie conformationnelle ou stéréotaxique si résidu; PAS de progestérone

● Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.