

Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Atteinte successive nerfs isolés.

Symptômes

Déficits sensitivo-moteurs asymétriques douleurs

Causes

Vascularite (PAN Wegener) diabète lèpre
amylose

Complications

Handicap fonctionnel sévère atteinte respiratoire

Traitement

Traitement cause corticoïdes si vascularite

Diagnostic différentiel

Polyneuropathie Guillain-Barré neuropathie compressive

Examens paracliniques

EMG (atteinte multifocale asymétrique) biopsie neuromusculaire bilan vascularite

Protocole médicamenteux

Vascularite: Prednisone 1mg/kg/j + Cyclophosphamide si sévère; Diabète: Contrôle glycémique strict; Kinésithérapie; Orthèses

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.