

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Voir Onychomycose. Infection fongique ongle.

Symptômes

Ongle épaissi jaune friable déformé

Causes

T. rubrum humidité diabète

Complications

Porte entrée érysipèle extension

Traitement

Terbinafine orale 6 mois

Diagnostic différentiel

Psoriasis unguéal traumatisme lichen mélanome sous-unguéal

Examens paracliniques

Prélèvement mycologique

Protocole médicamenteux

Terbinafine 250mg/j PO 6 mois (pieds); Amorolfine vernis 5% x1/sem; Avulsion chimique urée 40% si dystrophie totale

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Ambulatoire

contrôle 7-14j

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.