

Gravité **GRAVE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Syndrome tumoral NEM1.



Symptômes

Hyperparathyroïdie tumeur pancréas

adénome hypophyse



Causes

Mutation MEN1 autosomique dominant



Complications

Gastrinome insulinome prolactinome



Traitement

Chirurgie tumeurs surveillance à vie



Diagnostic différentiel

Hyperparathyroïdie isolée adénome hypophyse sporadique



Examens paracliniques

Calcémie PTH gastrine insuline prolactine GH IRM hypophyse scanner TAP génétique MEN1



Protocole médicamenteux

Hyperparathyroïdie: Parathyroïdectomie subtotale; Gastrinome: IPP + Chirurgie si possible; Prolactinome: Cabergoline; Dépistage familial génétique



Interprétation des examens

Scanner: Collections masses épanchements IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.