

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Infection osseuse hémotogène de l'enfant.



Symptômes

Douleur osseuse intense fièvre impotence

boiterie



Causes

S. aureus H. influenzae (<5 ans)

drépanocytose (Salmonella)



Complications

Abcès sous-périosté arthrite septique chronicité



Traitement

ATB IV puis relais oral 4-6 semaines



Diagnostic différentiel

Arthrite septique fracture tumeur osseuse RAA ostéosarcome



Examens paracliniques

IRM osseuse (précoce et sensible) NFS CRP/PCT hémocultures ponction sous-périostée



Protocole médicamenteux

Céfamandole 150mg/kg/j IV 3-5j puis Amoxicilline-clavulanate PO; Si SARM: Vancomycine 60mg/kg/j IV; Durée totale 4-6 semaines;
Critères relais oral: Apyrexie+CRP en baisse

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Pla<150000=thrombopénie

CRP>5=inflammation

>100=bactérien

IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.