

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Étranglement du gland par prépuce rétracté.

Symptômes

Œdème gland douloureux prépuce bloqué en arrière

Causes

Phimosis décalottage forcé oubli recalottage

Complications

Nécrose gland si retard

Traitement

Réduction manuelle urgence circoncision à froid

Diagnostic différentiel

Torsion testiculaire balanite hématome pénien

Examens paracliniques

Clinique

Protocole médicamenteux

Réduction manuelle: Compression gland 5-10min + manœuvre de réduction; Anesthésie pénienne (bloc dorsal); Si échec: Incision dorsale anneau constricteur; Circoncision programmée à distance

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.