

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Infection gaine synoviale doigt.



Symptômes

Doigt en crochet douloureux

œdème fusiforme

douleur extension passive



Causes

Plaie pénétrante

piqûre

morsure

diabète



Complications

Nécrose tendineuse

raideur

amputation si retard



Traitement

Chirurgie urgente + ATB IV



Diagnostic différentiel

Panaris

arthrite septique

goutte

ténosynovite non infectieuse



Examens paracliniques

Clinique (4 signes de Kanavel)

radio doigt

NFS/CRP



Protocole médicamenteux

Chirurgie urgente: Ouverture gaine + lavage abondant; Amoxicilline-clavulanate 2g x3/j IV; Rééducation précoce post-opératoire; Morsure: + Métronidazole

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Pla<150000=thrombopénie

CRP>5=inflammation

>100=bactérien

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.