

Gravité **MOYENNE**

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Extériorisation du rectum par l'anus.

Symptômes

Masse rouge sortant par l'anus efforts

incontinence

Causes

Constipation chronique multiparité

troubles plancher pelvien

Complications

Incarcération ulcération incontinence

Traitement

Rectopexie chirurgicale rééducation périnéale

Diagnostic différentiel

Hémorroïdes prolabées polype rectal intussusception

Examens paracliniques

Examen clinique (effort poussée) manométrie anorectale défécographie IRM

Protocole médicamenteux

Enfant: Traitement constipation (résolution spontanée); Adulte: Rectopexie ventrale cœlioscopique (Orr-Loygue); Rééducation périnéale; Intervention de Delorme si fragile

Interprétation des examens

IRM: T1/T2/FLAIR selon indication

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.