

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Voir Lithiase salivaire.

Symptômes

Colique salivaire

tuméfaction glandulaire aux repas

Causes

Stase salivaire

déshydratation

Complications

Surinfection

atrophie glandulaire

Traitement

Sialendoscopie

sous-maxillectomie si récidivant

Diagnostic différentiel

Tumeur salivaire

adénopathie

kyste

Examens paracliniques

Panoramique

échographie

scanner sans injection

Protocole médicamenteux

Sialendoscopie extraction; Massage + sialagogues; Sous-maxillectomie si récidivant

Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

☑ Prise en charge hospitalière

Ambulatoire

contrôle 7-14j

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.