

## Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



### Définition

Aphtes buccaux récurrents.



### Symptômes

Ulcération buccale douloureuse récurrente

superficielles



### Causes

Stress

traumatisme

alimentation

carence

Behçet



### Complications

Impact alimentaire

aphtes géants



### Traitement

Corticoïdes topiques

colchicine si sévère



### Diagnostic différentiel

Behçet

Crohn buccal

herpès

pemphigus

carcinome buccal



### Examens paracliniques

Clinique

NFS (carence fer/B12/folates)

bilan Behçet si sévère



### Protocole médicamenteux

Triamcinolone pâte adhésive x3/j; Bains bouche bicarbonate; Colchicine 1mg/j si >3 poussées/an; Thalidomide 50-100mg/j si réfractaire (CI grossesse); Bilan carenciel



### Interprétation des examens

NFS: Hb<12F/<13H=anémie

GB>10000=infection

Pla<150000=thrombopénie

## ☑ Prise en charge hospitalière

Ambulatoire

contrôle 7-14j

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.