

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

•

Définition

Obstruction veine cave supérieure.

•

Symptômes

Œdème visage/cou/MS

turgescence jugulaire

circulation collatérale

cyanose

•

Causes

Cancer poumon

lymphome

thrombose cathéter

•

Complications

Œdème cérébral

détresse respiratoire

•

Traitement

Corticoïdes

radiothérapie urgente

stent endovasculaire

•

Diagnostic différentiel

Péricardite constrictive

IC droite

tumeur médiastinale bénigne

•

Examens paracliniques

Scanner thoracique injecté (thrombose VCS

masse)

phlébographie

biopsie tumeur

•

Protocole médicamenteux

Dexaméthasone 4mg x4/j IV; Stent endovasculaire VCS (soulagement rapide); Radiothérapie urgente si cancer radiosensible; Chimiothérapie si lymphome; Anticoagulation si thrombose

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

☐☐ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.