

Gravité MOYENNE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Compression duodénum par AMS (syndrome de Wilkie).



Symptômes

Vomissements post-prandiaux bilieux

amaigrissement

satiété précoce



Causes

Amaigrissement rapide

chirurgie rachis

brûlures



Complications

Dénutrition

déshydratation



Traitement

Nutrition

position genupectorale

chirurgie si échec



Diagnostic différentiel

Sténose duodénale

tumeur

SMA

gastroparésie



Examens paracliniques

Scanner (angle aorto-mésentérique $<25^\circ$)

distance AMS-aorte $<8\text{mm}$)

TOGD



Protocole médicamenteux

Position décubitus latéral gauche ou genupectorale post-prandiale; Nutrition entérale par SNG post-angle; Prise poids; Chirurgie: Duodénojunostomie si échec

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Collections

masses

épanchements

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.