

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Tétanos du nouveau-né dans pays en développement.



Symptômes

Trismus refus tétée spasmes généralisés

opisthotonos



Causes

Contamination ombilicale mère non vaccinée



Complications

Apnées fractures pneumonie décès 50-90%



Traitement

Immunoglobulines métronidazole diazépam



Diagnostic différentiel

Sepsis néonatal méningite encéphalite hypocalcémie



Examens paracliniques

Clinique pas d'examen biologique fiable



Protocole médicamenteux

Immunoglobulines antitétaniques 500UI IM; Métronidazole 15mg/kg/j IV; Diazépam 0.1-0.3mg/kg/6h IV; Soins ombilicaux; Ventilation si spasmes respiratoires; Vaccination mère



Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Urgences

ABCDE

monitoring

Hospitalisation spécialisée/réa

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.