

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Thyroïdite subaiguë post-virale douloureuse.

## Symptômes

Douleur cervicale antérieure irradiant oreille

fièvre

thyrotoxicose transitoire

## Causes

Post-virale

inflammation granulomateuse

## Complications

Phase hypothyroïdienne transitoire

## Traitement

AINS

corticoïdes si sévère

bêtabloquants si thyrotoxicose

## Diagnostic différentiel

Thyroïdite de Hashimoto

Basedow

cancer thyroïde

abcès

## Examens paracliniques

VS très élevée

TSH basse/T4L élevée (phase initiale)

scintigraphie blanche

échographie (zone hypoéchogène)

## Protocole médicamenteux

Phase thyrotoxicque: Propranolol 40mg x3/j; AINS: Naproxène 500mg x2/j; Si échec: Prednisone 40mg/j décroissance 4-6 semaines; PAS d'antithyroïdiens; Récupération spontanée

## ☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte/ambulatoire

Éducation thérapeutique

Prévention récidives

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Sirop/dispersibles; Paracétamol 15mg/kg/6h

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter si IR/IH; Sujet âgé réduire 25-50%

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.