

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Perception de sons sans source externe.

Symptômes

Bourdonnements

sifflements unilatéraux ou bilatéraux

Complications

Dépression

insomnie

anxiété

Causes

Trauma sonore

presbyacousie

otospongiose

Ménière

Traitement

TCC

habituation

appareillage

Diagnostic différentiel

Schwannome

HTI

anévrisme

otospongiose

Examens paracliniques

Audiométrie

IRM si unilatéral (éliminer schwannome)

Protocole médicamenteux

TCC (thérapie cognitivo-comportementale); Masquage sonore; Appareillage si surdité associée

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.