

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Oblitération voies biliaires néonatale.

## Symptômes

Ictère persistant >14j

selles décolorées

hépatomégalie

## Causes

Oblitération congénitale voies biliaires

## Complications

Cirrhose biliaire

hypertension portale

décès

## Traitement

Portoentérostomie de Kasai <45j

transplantation

## Diagnostic différentiel

Ictère au lait de mère

hépatite néonatale

choledocholithiase

## Examens paracliniques

Bilirubine conjuguée élevée

échographie

scintigraphie HIDA

biopsie hépatique

## Protocole médicamenteux

Portoentérostomie de Kasai urgente (<45j de vie); Acide ursodésoxycholique; Vitamines ADEK; Transplantation hépatique si échec Kasai

## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée

Urgences

ABCDE

monitoring

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.