

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Sepsis avec défaillance circulatoire.

## Symptômes

Fièvre/hypothermie hypotension réfractaire  
marbrures confusion oligurie

## Causes

Infection bactérienne fongique

## Complications

Défaillance multiviscérale CIVD décès 40%

## Traitement

Remplissage noradrénaline ATB urgente  
source control

## Diagnostic différentiel

Choc cardiogénique anaphylactique hémorragique

## Examens paracliniques

Lactates >2mmol/L hémocultures x3 PCT NFS gazométrie

## Protocole médicamenteux

ATB dans l'heure: Pipéracilline-tazobactam 4g x4/j + Amikacine 25mg/kg; NaCl 30ml/kg en 1h; Noradrénaline 0.1-3µg/kg/min; Source control; Hydrocortisone 200mg/j si réfractaire

## ☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée

Urgences

ABCDE

monitoring

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

┆ ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.