

Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Cause la plus fréquente syndrome néphrotique adulte.



Symptômes

Protéinurie massive

syndrome néphrotique

HTA modérée



Causes

Auto-immune (anti-PLA2R)

cancer (paranéoplasique)



Complications

IRC

thrombose veine rénale



Traitement

IEC

rituximab

cyclophosphamide



Diagnostic différentiel

Néphropathie diabétique

amylose

lupus



Examens paracliniques

Protéinurie

anti-PLA2R

biopsie rénale (dépôts sous-épithéliaux)

bilan cancer si >60 ans



Protocole médicamenteux

IEC/ARA2 + Surveillance 6 mois (rémission spontanée 30%); Si persistant: Rituximab 1g J1+J15; Alternative: Cyclophosphamide+Prednisone; Dépistage cancer si PLA2R négatif



Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.