

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Voir Embolie artérielle. Urgence vasculaire.

## Symptômes

Douleur pâleur absence pouls paresthésies  
paralysie

## Causes

FA athérome dissection traumatisme

## Complications

Amputation si >6h rhabdomyolyse

## Traitement

Embolectomie anticoagulation

## Diagnostic différentiel

TVP sciatique compression

## Examens paracliniques

Écho-doppler angioscanner

## Protocole médicamenteux

Héparine bolus + Embolectomie Fogarty <6h; Fasciotomie si œdème

## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée

Urgences

ABCDE

monitoring

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.