

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Tumeur osseuse bénigne la plus fréquente.

## Symptômes

Masse dure indolore juxta-articulaire adolescent

## Causes

Exostose métaphysaire croissance

## Complications

Transformation chondrosarcome rare si multiple

## Traitement

Surveillance résection si gênant

## Diagnostic différentiel

Ostéosarcome chondrosarcome myosite ossifiante

## Examens paracliniques

Radio (excroissance osseuse pédunculée) scanner/IRM si doute transformation

## Protocole médicamenteux

Surveillance clinique+radio; Résection si: gênant, croissance rapide, >2cm cartilage, post-puberté; Maladie exostosante multiple: surveillance rapprochée

## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.