

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Tumeur osseuse maligne primitive adolescent.



## Symptômes

Douleur osseuse progressive

tuméfaction

fracture pathologique



## Causes

Croissance rapide

Rb

Li-Fraumeni



## Complications

Métastases pulmonaires (20%)

récidive



## Traitement

Chimiothérapie néoadjuvante + chirurgie conservatrice



## Diagnostic différentiel

Sarcome Ewing

ostéomyélite

kyste osseux

chondrosarcome



## Examens paracliniques

Radio (ostéolyse+ostéocondensation)

éperon de Codman)

IRM locale

biopsie

scanner thoracique



## Protocole médicamenteux

Chimio néoadjuvante: MAP (Méthotrexate 12g/m<sup>2</sup> + Doxorubicine 75mg/m<sup>2</sup> + Cisplatine 120mg/m<sup>2</sup>); Chirurgie conservatrice; Chimio adjuvante selon réponse histologique; Survie 70% si localisé



## Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☑️ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée

Urgences

ABCDE

monitoring

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☑️☑️☑️☑️ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠️ **Avertissement** : ⚠️ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.