

Gravité **MOYENNE**

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

## ● Définition

Lésion plexus brachial néonatale.

## ● Symptômes

Bras immobile position repos

Moro asymétrique

## ● Causes

Dystocies épaules

macrosomie

extraction instrumentale

## ● ⚠ Complications

Paralysie permanente si C5-T1

Horner

## ● Traitement

Kinésithérapie

chirurgie microchirurgicale si pas récupération

## ● Diagnostic différentiel

Fracture clavicule/humérus

sepsis artriculaire

## ● Examens paracliniques

Clinique

EMG à 1 mois

IRM plexus

## ● Protocole médicamenteux

Kinésithérapie passive dès J1 (étirements doux); EMG à 1 mois; Chirurgie greffe nerveuse 3-6 mois si pas récupération biceps; Ostéotomie humérale secondaire si rotation

## ☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.