

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

Définition

Atteinte cutanée de la sarcoïdose.

Symptômes

Papules violacées
lupus pernio
érythème noueux
nodules

Causes

Sarcoïdose systémique

Complications

Impact esthétique
marqueur sévérité

Traitement

Dermocorticoïdes
hydroxychloroquine

Diagnostic différentiel

Lupus cutané
lichen
lymphome cutané

Examens paracliniques

Biopsie (granulome non caséeux)
radio thoracique
ECA
calcémie

Protocole médicamenteux

Dermocorticoïdes puissants x1/j; Hydroxychloroquine 400mg/j; Méthotrexate si résistant; Surveillance systémique

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.