

Gravité **MOYENNE**

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Neurinome de l'acoustique.

Symptômes

Surdité perception unilatérale progressive

acouphènes

vertiges

Complications

Compression tronc cérébral

paralysie faciale

Diagnostic différentiel

Méningiome APC

cholestéatome

métastase

Examens paracliniques

IRM cérébrale (masse APC rehaussée)

audiométrie

PEA

Protocole médicamenteux

<2cm asymptomatique: Surveillance IRM/an; 2-3cm: Radiochirurgie Gamma Knife; >3cm: Microchirurgie rétrosgmoïdienne; NF2: Bévacizumab

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

Causes

Tumeur bénigne nerf VIII

NF2 si bilatéral

Traitement

Surveillance

radiochirurgie

microchirurgie

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.