

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Hématurie+protéinurie+HTA+œdèmes+IR aiguë.



Symptômes

- Hématurie macroscopique
- HTA
- œdèmes
- oligurie



Causes

- GN post-streptococcique
- néphropathie IgA
- lupus



Complications

- IRC
- HTA maligne
- OAP



Traitement

- Repos
- diurétiques
- contrôle HTA



Diagnostic différentiel

- Syndrome néphrotique
- pyélonéphrite
- SHU
- vascularite



Examens paracliniques

- BU (hématurie+protéinurie)
- créatinine
- C3/C4
- ASLO
- biopsie rénale si adulte



Protocole médicamenteux

Restriction hydrosodée; Furosémide 40-80mg/j; IEC si HTA; Traiter cause; Pronostic excellent si post-streptococcique enfant



Interprétation des examens

- Interpréter en corrélation clinique

Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.