

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Néoplasme intracrânien primaire ou secondaire.



Symptômes

Céphalées progressives

convulsions

déficit neurologique

HTIC



Causes

Gliome

méningiome

métastase

médulloblastome



Complications

Engagement

hydrocéphalie

décès



Traitement

Chirurgie

radiothérapie

chimiothérapie

corticoïdes



Diagnostic différentiel

AVC

abcès

SEP

encéphalite



Examens paracliniques

IRM cérébrale (avec gadolinium)

scanner

biopsie/exérèse



Protocole médicamenteux

Corticoïdes: Dexaméthasone 4-16mg/j (œdème); Chirurgie exérèse maximale; Glioblastome: Témzolomide 75mg/m²/j + Radiothérapie 60Gy puis Témzolomide adjuvant 6 cycles

☐☐ Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation spécialisée

Urgences

ABCDE

monitoring

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

┆ NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

┆ ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

┆ ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.