

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Atrophie vaginale post-ménopausique.

Symptômes

Sécheresse dyspareunie brûlures

infections récurrentes

Causes

Carence estrogénique post-ménopause

Complications

Infections urinaires récidivantes impact sexuel

Traitement

Estrogènes locaux hydratants vaginaux

Diagnostic différentiel

Candidose vaginose lichen cancer

Examens paracliniques

Clinique pH vaginal >4.6 cytologie

Protocole médicamenteux

Estradiol vaginal (Estring anneau ou Vagifem 10µg ovule x3/sem); Hydratants: Replens x3/sem; DHEA vaginale (Intrarosa) 6.5mg/j; Ospémifène 60mg/j PO si CI locaux

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.