

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

VPPB, cause de vertiges la plus fréquente.

Symptômes

Vertiges brefs rotatoires aux changements position tête

nausées

Complications

Chutes

anxiété

récidive

Causes

Canalolithiase (otolithes déplacés canal semi-circulaire)

Traitement

Manœuvre libératoire (Epley)

Semont)

Diagnostic différentiel

Ménière

névrite vestibulaire

AVC cérébelleux

tumeur APC

Examens paracliniques

Manœuvre Dix-Hallpike (nystagmus caractéristique)

VNG

IRM si atypique

Protocole médicamenteux

Manœuvre d'Epley (canal postérieur): Efficacité >80% en 1-2 séances; Manœuvre de Semont alternative; PAS de médicaments antivertigineux prolongés; Exercices Brandt-Daroff si récidivant

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Prise en charge selon gravité

Éducation thérapeutique

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies mg/kg; Paracétamol 15mg/kg/6h; PAS aspirine

ENFANT (2-15 ans): Posologies poids; Formes sirop

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Adapter IR/IH

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.