

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Épisode douloureux aigu drépanocytaire.

Symptômes

Douleurs osseuses intenses fièvre possible

Causes

Falciformation dans microcirculation

Complications

STA AVC séquestration splénique

Traitement

Hydratation morphine O2

Diagnostic différentiel

Ostéomyélite arthrite septique fracture pathologique

Examens paracliniques

NFS réticulocytes CRP radio thorax si fièvre

Protocole médicamenteux

Morphine titrée IV 0.1mg/kg/4h; Hydratation NaCl 2.5L/m²/j; O2 si SpO2<95%; Transfusion si Hb<6 ou STA; Paracétamol 1g/6h

Interprétation des examens

Interpréter en corrélation clinique

☑ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation

Urgences

monitoring

Prise en charge adaptée à la gravité

☑☑☑☑☑ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON: Posologies mg/kg

ENFANT: Posologies poids

ADULTE: Posologies standard

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.